НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
«АГРОПИЩЕПРОМ»
(НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ»)

Тамбовская область, г. Мичуринск-наукоград РФ,
ул. Советская д. 286, помещение 6, офис 3 (технологический отдел)
Тел. 8 (475-45) 5-09-80, 8 (902) 734-48-79, 8-953-719-90-43,
8 (475-45) 5-14-13, 8 (960) 665-44-41
эл. почта: agropit@mail.ru, tu@agropit.ru,
сайты: www.agropit.ru, www.kupi-tu.ru

СТОИМОСТЬ **18 000 РУБ**	**ТУ, ТИ 10.20.26-1168-37676459-2025** **ИКРА РЫБ СОЛЕНАЯ ПАСТЕРИЗОВАННАЯ**

Документ прошел федеральную экспертизу Росстандарта РФ

Дата введения в действие — 20.05.2025 год. Без ограничения срока действия. Технические условия включены в Федеральный информационный фонд стандартов РФ. Документ содержит: экспертное заключение Росстандарта РФ, каталожный лист, технические условия, технологическую инструкцию, отработанные рецептуры.

Область применения

Настоящие технические условия распространяются на пастеризованную соленую икру рыб (далее по тексту - икра рыб, продукция) охлажденную. Продукция предназначена для реализации в розничной и оптовой торговой сети и в предприятиях общественного питания.

Продукция предназначена для непосредственного употребления в пищу и приготовления различных блюд и закусок.

Продукция вырабатывается в следующем ассортименте*:

- икра белого амура соленая пастеризованная;
- икра берша соленая пастеризованная;
- икра воблы соленая пастеризованная;
- икра густеры соленая пастеризованная;
- икра жереха соленая пастеризованная;
- икра ерша соленая пастеризованная;
- икра карася соленая пастеризованная;
- икра красноперки соленая пастеризованная;
- икра карпа соленая пастеризованная;
- икра камбалы соленая пастеризованная;
- икра кефали соленая пастеризованная;
- икра линя соленая пастеризованная;
- икра муксуна соленая пастеризованная;
- икра мойвы соленая пастеризованная;
- икра минтая соленая пастеризованная;
- икра леща соленая пастеризованная;
- икра наваги соленая пастеризованная;

- икра налима соленая пастеризованная;
- икра нототении соленая пастеризованная;
- икра нельмы соленая пастеризованная;
- икра окуня соленая пастеризованная;
- икра омуля соленая пастеризованная;
- икра плотвы соленая пастеризованная;
- икра пинагора соленая пастеризованная;
- икра пикши соленая пастеризованная;
- икра пыжьяна соленая пастеризованная;
- икра пеляди соленая пастеризованная;
- икра путассу соленая пастеризованная;
- икра ряпушки соленая пастеризованная;
- икра сайды соленая пастеризованная;
- икра сельди соленая пастеризованная;
- икра сазана соленая пастеризованная;
- икра сома соленая пастеризованная;
- икра судака соленая пастеризованная;
- икра сига соленая пастеризованная;
- икра толстолобика соленая пастеризованная;
- икра трески соленая пастеризованная;
- икра щуки соленая пастеризованная;
- икра чехони соленая пастеризованная;
- икра чира соленая пастеризованная;
- икра язя соленая пастеризованная.

Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции фирменными или придуманными названиями;

*Зоологические виды рыб – в приложение Сазан (лат. *Cyprinus carpio)*; Обыкновенный сом, или европейский сом (лат. *Silurus glanis*); Обыкновенный судак (лат. *Sander lucioperca*); Синец (лат. *Ballerus ballerus*); Белый амур (лат. *Ctenopharyngodon idella*); Берш (лат. *Sander volgensi)*; Вобла (лат. *Rutilus caspicus*); Густера - (лат. *Blicca bjoerkna*); Жерех (лат. *Aspius aspius)*; Елец (лат. *Leuciscus leuciscus*); Обыкновенный ёрш (лат. *Gymnocephalus cernuus*); Карась (лат. *Carassius);* Краснопёрка, сороча, сорога, сорожка, краснопёрая плотва, краснокрыл или красноглазка (лат. *Scardinius erythrophthalmus*); Сазан, или обыкновенный карп (лат. *Cyprinus carpio*); Линь (лат. *Tinca tinca*); Лещ, или обыкновенный лещ, или восточный лещ, или дунайский лещ (лат. *Abramis brama*); Налим, или обыкновенный налим (мень) (лат. *Lota lota*); Речной окунь, или обыкновенный окунь (лат. *Perca fluviatilis*); Толстолобики или толстолобы (лат. *Hypophthalmichthys*); Чехонь (лат. *Pelecus cultratus*); Щука, или обыкновенная щука (лат. *Esox lucius*); Язь (лат. *Leuciscus idus*), Муксун (лат. *Coregonus muksun*); Нельма (лат. *Stenodus leucichthys nelma*); Омуль, или арктический омуль (лат. *Coregonus autumnalis*); Пелядь (лат. *Coregonus peled)*; Сибирская ряпушка (лат. *Coregonus sardinella*; саурей, обская сельдь; Европейская ряпушка, или рипус, или килец (лат. *Coregonus albula*); Сиг (лат. *Coregonus canadensis)*; Чир (лат. *Coregonus nasus)*; Мойва (лат. *Mallotus villosus*); Минтай (лат. *Theragra chalcogramma*); Треска (Атлантическая треска (лат. *Gadus morhua*); Пикша (лат. *Melanogrammus aeglefinus*); Сайда (лат. *Pollachius virens*); Дальневосточная навага, или вахня, или тихоокеанская навага (лат. *Eleginus gracilis)*; Путассу (лат. *Micromesistius poutassou Risso* — Северная путассу; лат. *Micromesistius australis Norman* — Южная путассу); Сельдь (тихоокеанская лат. *Clupea pallasii*, атлантическая лат. *Clupea harengus*, азово-черноморская лат. *Alosa immaculata*, балтийская лат. *Clupea harengus membras*, беломорская лат. *Clupea pallasi marisalbi*, Сельдь Кесслера лат. *Alosa kessleri*, каспийская (волжская) лат. *Alosa kessleri volgensis*).*;* Камбала (Колючая камбала (лат. *Acanthopsetta nadeshnyi*), или камбала Надёжного; Камбала Герценштейна (лат. *Cleisthenes herzensteini*); Остроголовая камбала (лат. *Cleisthenes pinetorum*); Бородавчатая камбала (лат. *Clidoderma asperrimum*); Камбала

Григорьева (лат. *Eopsetta grigorjewi*), или дальневосточная камбала; Камбала Джордана (лат. *Eopsetta jordani*), или калифорнийская эопсетта; Красная камбала (лат. *Glyptocephalus cynoglossus*); Дальневосточная длинная камбала (лат. *Glyptocephalus stelleri*), или малорот Стеллера; лат. *Glyptocephalus zachirus*; Японская палтусовидная камбала (лат. *Hippoglossoides dubius*), или японская камбала-ёрш; Северная палтусовидная камбала (лат. *Hippoglossoides elassodon*); Камбала-ёрш (лат. *Hippoglossoides platessoides*); Беринговоморская палтусовидная камбала (лат. *Hippoglossoides robustus*); Двухцветная камбала (лат. *Kareius bicoloratus*); Двухлинейная камбала (лат. *Lepidopsetta bilineata*); Белобрюхая камбала (лат. *Lepidopsetta mochigarei*); Северная двухлинейная камбала (лат. *Lepidopsetta polyxystra*); Желтопёрая камбала (лат. *Limanda aspera*); Желтохвостая лиманда (лат. *Limanda ferruginea*), или желтохвостая камбала; Сахалинская камбала (лат. *Limanda sakhalinensis*); Полярная камбала (лат. *Liopsetta glacialis*); Гологоловая камбала (лат. *Liopsetta putnami*); Орегонская камбала (лат. *Lyopsetta exilis*); Малоголовая камбала (лат. *Microstomus kitt*); Восточнотихоокеанская малоротая камбала (лат. *Microstomus pacificus*), или тихоокеанский малорот; Звёздчатая камбала (лат. *Platichthys stellatus*); Морская камбала (лат. *Pleuronectes platessa*); Жёлтая морская камбала (лат. *Pleuronectes quadrituberculatus*), или желтобрюхая камбала, или четырёхбугорчатая камбала; Рогатая камбала (лат. *Pleuronichthys cornutus*); Пятнистая камбала (лат. *Pleuronichthys ritteri*); Рогатая камбала (лат. *Pleuronichthys verticalis*); Пятнистая камбала (лат. *Psettichthys melanostictus*); Зимняя камбала (лат. *Pseudopleuronectes americanus*); Желтополосая камбала (лат. *Pseudopleuronectes herzensteini*); Камбала Шренка (лат. *Pseudopleuronectes schrenki*); Японская камбала (лат. *Pseudopleuronectes yokohamae*); Лобан, или кефаль-лобан, или чёрная кефаль - (лат. *Mugil cephalus*); Нототения (Длиннопёрая нототения (лат. *Aethotaxis mitopteryx*), Нототения-остролучка (лат. *Gobionotothen acuta*), Чешуеглазая нототения (лат. *Lepidonotothen kempi*), Большеглазая нототения (лат. *Lepidonotothen macrophthalma*) Серая нототения (лат. *Lepidonotothen squamifrons*), Нототения-чиж (лат. *Notothenіops tchizh*), Синяя нототения (лат. *Paranotothenia magellanica*), Короткохвостая патагонская нототения (лат. *Patagonotothen brevicauda*), Зубатая патагонская нототения (лат. *Patagonotothen canina*), Рогатая патагонская нототения (*Patagonotothen cornucola*), Элегантная патагонская нототения (лат. *Patagonotothen elegans*), Желтопёрая патагонская нототения (лат. *Patagonotothen guntheri*), Патагонская нототения Джордана (лат. *Patagonotothen jordani*), Длинноплавниковая патагонская нототения (лат. *Patagonotothen longipes*), Патагонская нототения Рамсея (лат. *Patagonotothen ramsayi*), Нототения-сима (лат. *Patagonotothen sima*), Чешуйчатая патагонская нототения (лат. *Patagonotothen squamiceps*), Мозаичная патагонская нототения (лат. *Patagonotothen tessellata*), Патагонская нототения Вилтона (лат. *Patagonotothen wiltoni*)); Пыжьян (сиг) - лат. *Coregonus lavaretuspidschian*— пыжьян, или сибирский сиг; Пинагор, или рыба-воробей (лат. *Cyclopterus lumpus*);

Рекомендуемые сроки годности икры соленой пастеризованной:

- при температуре минус 2°С - минус 4 °С (без консервантов) – не более 6 месяцев;
- при температуре хранения минус 2°С - минус 4°С (с добавлением консерванта) – 9 месяцев;

Рекомендуемые сроки годности после вскрытия упаковки при температуре хранения от 0°С до + 6 °С – не более 24 часов.

Предприятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.